

דעם בריח
בעפעך

פון הערפּיס
גיי-געבוירן קינד
וואָר אַ באַשיצן א״ער



העלט דעפארטמענט
ניו יארק סטעיט

A high-magnification micrograph showing a cluster of approximately 15-20 spherical particles. Each particle has a distinct, highly textured, almost crystalline or granular surface. The particles are arranged in a somewhat loose, overlapping cluster. The background is dark and out of focus.

CDC/Dr. Fred Murphy; Sylvia Whitfield

הערפס סימפלעקס וויירוס
פארגרעסערט צעלן פון

מציצה בפה וועלכע ווערט
דורכגעפירט ביי טייל ברית'ן,
איז באקאנט צו פארוארזאכן
הערפּיס ווירוס אינפּעקציעס
ביי קליינע קינדער. די העלט
דעפארטמענט רעקאמענדירט
אז עלטערן זאלן פרעגן דעם
מוהל אויב ער פראקטיצירט
מציצה בפה איידער
אויסקלויבן א מוהל.

רעדוויצין דעם געפאר

עס איז נישט פאראן קיין אויסגערעכענעטע וועגן צו עלימינירן דעם געפאר פון **מציעה כפה**. דאך, אויב **מציעה כפה** ווערט דורכגעפירט טראץ די באקאנטע געפארן, זענען פאראן כאטש צוויי וועגן צו רעדוויצן דעם מעגליכע געפאר פון א אינפעקציע. איינס: דער מוהל קען נעמען אנטי-וויירול מעדעצין וועלכע קען רעדוויצן די געפאר פון פארשפרייטן הערפּיס. צוויי: דער מוהל קען נוצן מויל-אויסשווענקונג מיט מויל-וואש וועלכע אנטהאלט אלקאהאל איידער **מציעה כפה**. אבער עס איז נישט פאראן קיינע באווייזן אז אונטערנעמען די שריט טוט עלימינירן דעם געפאר פון איבערפירן הערפּיס דורך **מציעה כפה**, און מיט-דעם-אלעס קען א קינד ווערן קראנק פון הערפּיס. פאר מער אינפארמאציע, רעדט ביטע מיט אייער קינדער דאקטאר אדער פאמיליע דאקטאר.

פיל טוען נישט פראקטיצירן מציעה כפה

געוויסע רעליגיעזע רבנים טוען באטראכטן **מציעה כפה** אלס די איינציגע אנגעמאכטע מיטל ארויסצווייגן בלוט פונעם ברית שניט. אבער, אנדערע נוצן אנדערע מעטאדן. ווי למשל, אמאל ווערט אנוצט א גלאזענע רער אדער א גלאזענע רער באהאפטן צו א גומענע שפיץ. דאס טוט ארויסציען בלוט אין א וועג וועלכע טוט נישט ארייננעמען דירעקטע קאנטאקט צווישן דעם מוהל'ס מויל און דאס קינד'ס שניט. אנדערע נוצן א ספאנדש אדער א סטעריליזירטע גאזע צו אוועקווישן דאס בלוט. אנדערש ווי **מציעה כפה**, איז נישטא קיין שום באווייזן אז סיי וועלכע פון די פראקטיצירונגען פארזאמלן אינפעקציעס.

פאר מער אינפארמאציע איבער ברית, רעדט צו אייער קינדער דאקטאר אדער פאמיליע דאקטאר.

פיעגן איבער מציעה כפה איידער די טאג פון די ברית

געוויסע עלטערן וועמענס קינדער האבן געהאט **מציעה כפה** זאגן אז זיי האבן נישט געוואוסט פון פיער אז דער מוהל וועט דאס מאכן. די העלט דעפארטמענט טוט רעקאמענדירן אז עלטערן זאלן פרעגן דעם מוהל אויב ער פראקטיצירט **מציעה כפה** בעפארן אויסוועלן א מוהל. דאס וועט געבן פאר עלטערן צייט צו מאכן א פלאן לויט דעם, אריינגערעכנט, באטראכטן אנדערע מעגליכקייטן.

וויאזוי מציעה כפה קען פארשפרייטן הערפּיס

מער ווי העלפט פון אלע ערוואקסענע האבן מויל הערפּיס. מויל הערפּיס קען פארזאמלן מויל ווייטאגן אבער מערסטנס טייל מענטשן מיט מויל הערפּיס ווייסן נישט אז זיי זענען אנגעשטעקט און האבן נישט קיין סימפטאמען. מענטשען קענען פארשפרייטן הערפּיס אפילו ווען זיי האבן נישט קיין סימפטאמען. ניי געבוירענע קינדער זענען אין א געפאר פון א ערנסטע אינפעקציע אויב זיי ווערן אויסגעשטעלט צו הערפּיס. דאס איז ווייל זייער אימיון סיסטעם איז נאכנישט גענוג רייף צו קענען באקעמפן אינפעקציעס. ביי א **מציעה כפה**, טוט דער מוהל לייגן זיין מויל דירעקט אויפן פריש געמל'טע מקום המילה צו ארויסזיגן בלוט פון דעם שניט. מויל הערפּיס טוט זיך גרינג פארשפרייטן דורך שפייטכעסן. דאס איז נאכמער אזוי ווען שפייטכעסן וואס ערהאלט די הערפּיס וויירוס רירט אן א שניט אדער א עפענונג אין די הויט, אזוי ווי ביי **מציעה כפה**. אויב דער מוהל האט מויל הערפּיס קען זיין אז ער ווייסט אפילו נישט, און ער קען מעגליך בטעות אריבערפירן הערפּיס צו דאס קינד ווען ער מאכט **מציעה כפה**.

פילע משפחות ווילן רעספּעקטירן רעליגיעזע טראדיציעס ווען זייערע קינדער ווערן געבוירן. אבער, א פראקטיק וואס ווערט אנגעזען **מציעה כפה**, וועלכע ווערט דורכגעפירט דורכאויס געוויסע רעליגיעזע בריתן, איז באקאנט צו פארזאמלן הערפּיס וויירוס אינפעקציעס ביי ניי-געבוירענע קינדער. עס איז נישט פאראן קיין שום באקאנטע מיטל צו עלימינירן דעם געפאר פון **מציעה כפה**, אבער עס זענען פאראן ווייניגסטענס צוויי מיטלען וועלכע קענען מעגליך רעדוויצן די געפאר פון אן אינפעקציע.

מציעה כפה ווערט דורכגעפירט דורך געוויסע מוהלים אין די אידישע געמיינדע. עס נעמט אריין אויסזיגן די ברית וואונד מיט די מויל. דעם מוהל'ס מויל און ליפן קומען זיך דירעקט צוואס מיט דאס ניי-געבוירן קינד'ס פריש געמל'טע מקום המילה. די ניי יארק סטעיט העלט דעפארטמענט האט דאקומענטירט פעלער פון הערפּיס אין ניי-געבוירענע אינגלעך נאך בריתן וועלכע זענען געמאכט געווארן מיט **מציעה כפה**. טייל פון די ניי-געבוירענע קינדער זענען געווארן ערנסט קראנק. איין קינד איז געשטארבן און צוויי אנדערע האבן געליטן פון מוח שאדנס.

צוליב דעם וואס די אימיון סיסטעם פון קליינע קינדער איז נאכנישט גענוג שטארק צו קענען באקעמפן אינפעקציעס, איז די הערפּיס וויירוס זייער א ערנסטער געפאר פאר קליינע קינדער. אויב א מוהל איז אנגעשטעקט מיט הערפּיס, דאן קען זיין **מציעה כפה** פראקטיצירונג אויסשטעלן דאס קינד צו הערפּיס וויירוס. כאטש עס פאסירט זעלטן אז א קינד זאל שטארבן פון דעם, איז פאראן א זיכערע געפאר פון אן אינפעקציע. אויב דאס קינד ווערט אנגעשטעקט, דאן וועט דאס קינד דארפן דורכגיין באהאנדלונגען אין שפיטאל. אפילו מיט די באהאנדלונגען, איז מעגליך אז דאס קינד וועט האבן לעבנסלענגליכע דיסעביליטיס.

די העלט דעפארטמענט טוט רעקאמענדירן אז קינדער וועלכע ווערן געמל'ט זאלן נישט דורכגיין **מציעה כפה**. כדי אייך צו העלפן באשיצן אייער קינד, ווילן מיר זיכער מאכן אז עלטערן פארשטייען דעם געפאר **איידער** די טאג פון די ברית, וועלאנג עס איז נאך דא צייט צו נעמען די נויטיגע באוואונגען, אדער זיך אומקוקן אויף אנדערע מעגליכקייטן.